

## BRACO FRANCES

\*

Es el más antiguo y conocido de todos los perros franceses de muestra y de él se dice que ya nace cazador por ser innatas sus cualidades venatorias. Adecuado para cualquier tipo de terreno, se muestra fogoso e impulsivo, teniendo necesidad, por tanto, de un buen adiestramiento que modere su impetuosidad. Dotado de un excelente olfato y de gran resistencia, sabe cazar tanto en terrenos secos con temperaturas altas como en terrenos húmedos con temperaturas rígidas, demostrando una gran adaptación, lo que es motivo para que se le prefiera a otras razas.

\*

La fecha de nacimiento de esta raza, de la cual descenderán casi todos los bracos de origen francés, se puede situar hacia finales del siglo XVI. Tuvo su momento de máximo esplendor a caballo entre los siglos XVII y XVIII y no existe manual de caza de aquella época que no hable de él exaltando sus dotes de olfato, resistencia y sentido venatorio. También aparece en cuadros de célebres pintores que lo representaron al lado de los nobles, quienes lo consideraban un digno ornamento, ya que era tenido en gran consideración, incluso por la familia real. Sin embargo, su notoriedad comenzó a disminuir desde entonces, hasta el punto que con el pasar del tiempo se ha vuelto cada vez más raro. Su retorno es historia relativamente reciente y se inicia en la segunda postguerra, cuando un grupo de cinófilos recuperando los pocos ejemplares puros que aún existían, comenzó su cría.

\*

El aspecto noble, la constitución sólida, el andar poco veloz y la cabeza imponente, son las principales características de este perro de muestra que se dice que caza bajo la escopeta, porque su búsqueda es tan atenta que no se le escapa nada.

\*

\*

Alzada a la cruz. Alzada a la cruz, de 57 a 66 cm. Peso, de 25 a 32 kg.

Cabeza. No demasiado pesada. Trufa marrón, gruesa, con fosas nasales bien abiertas. Hocico recto, ancho, rectangular. Labios bien caídos. Escotadura naso-frontal perfectamente acentuada. Cráneo casi plano o ligeramente convexo. Surco central poco marcado. Protuberancia occipital poco prominente.

Ojos. De color marrón o amarillo oscuro, bien abiertos y engarzados en las órbitas.

Orejas. De longitud media, de nacimiento a la altura del ojo, no demasiado anchas en la base, ligeramente plegadas redondeadas en el extremo.

Cuello. Bastante largo, ligeramente arqueado, con papada poco pronunciada.

Extremidades anteriores. Rectas, anchas, musculosas. Hombros muy musculosos, moderadamente oblicuos. Codos pegados. Metacarpos robustos.

Cuerpo. Tórax ancho, profundo, caído hasta los codos. Costillas redondeadas, pero no demasiado. Dorso ancho, recto. Riñón corto y musculoso, ligeramente arqueado. Grupa un poco oblicua.

Extremidades posteriores. Muslos con la musculatura, desarrollada y saliente, no excesivamente angulados. Corvejones anchos, poco angulados, de emplazamiento bajo sobre metacarpos cortos.

Pies. Compactos, casi redondos, con plantas gruesas y uñas fuertes.

Cola. Muy larga, generalmente se amputa. Puede ser corta ya desde el nacimiento.

Pelaje. Relativamente grueso y tupido, más fino sobre la cabeza y las orejas. Color: blanco con manchas marrones más o menos oscuras, a veces con pelos rojizos.

\*

ALIMENTACION. Las necesidades alimenticias, como ración de mantenimiento, varían según el tamaño desde las 1.450 a las 1.750 Kcal. diarias. Recordemos que, además de las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas y las vitaminas, la dieta debe contener, según el momento fisiológico, la justa cantidad de sales minerales. Estas cantidades, calculadas en miligramos para cada kilo de peso vivo, son las siguientes. Para el cachorro: calcio, 528 mg.; fósforo, 440 mg.; para el perro adulto: calcio 264 mg.; para la perra durante la lactancia: calcio, 460 mg.; fósforo, 320 - 450 mg.

CUIDADOS DIARIOS. La limpieza del pelaje se realiza con un guante para pelo liso, alternándolo con un paño suave.

ENFERMEDADES. La carencia de adecuadas cantidades de sales minerales es causa de enfermedades como el raquitismo y la osteoporosis: el primero se debe a la ausencia en los alimentos de calcio y fósforo; la segunda, a una excesiva cantidad de fósforo.