

Capitolo 7:

Treponematosi ed altre malattie a trasmissione sessuale



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo

7.1 Sifilide



Chancre sifilitico

(ulcera primaria della sifilide)

Ulcerazione con erosione situata sul glande o sul prepuzio. Tramite palpazione si può facilmente percepire l'indurimento. Gonfiore importante dei noduli linfatici inguinali, di solito unilateralmente.



lesioni basali: Escoriazioni (od ulcerazioni)

cause: Infezione



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



Chancre sifilitico continua

(ulcera primaria della sifilide)

Nella donna l'ulcera primaria è spesso accompagnata da un importante edema delle grandi labbra. Le caratteristiche dell'ulcera primaria nella donna sono identiche a quelle nell'uomo.

lesioni basali: Escoriazioni (od ulcerazioni)

cause: Infezione



ricerca

contenuti

stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



Sifilide secondaria

(*sifilide maculare*)

La sifilide secondaria si manifesta circa sei settimane dopo la comparsa dell'ulcera primaria, sotto forma di macchie ovali rosee, non pruriginose, poco o punto squamose. Queste macule sono situate principalmente sul tronco.

lesioni basali: Macula eritematosa

cause: Infezione



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



Sifilide secondaria tardiva

Papule ben distinte ed indurate, di colore rosso opaco, a volte brunastre, non pruriginose, situate sul tronco e sulle regioni prossimali degli arti.

lesioni basali: Papule dermiche

cause: Infezione



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



Sifilide papulosa

Macchie un po' rossastre con collaretto desquamante (collaretto di Biett). Questa sifilide papulosa si manifesta 4 a 12 mesi dopo la comparsa dell'ulcera primaria.

lesioni basali: Macula eritematosa;
Papule dermiche; Squame

cause: Infezione



ricerca

contenuti

stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



Gonorrea genitae

Arrossamento diffuso del glande, secrezione uretrale purulenta, notevole disuria e pollachiuria. Presenza di due molluschi contagiosi, pure trasmissibili per via sessuale.

lesioni basali: Macula eritematosa;
Papule epidermiche

cause: Infezione



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo