

Capítulo 7:

Treponematoses e outras doenças transmitidas sexualmente



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte

7.1 Sífilis



Acidente primário

Nódulo ulcerado localizado na glande ou no forro do pênis. Endurecimento nítido ao tacto. Adenopatia inguinal volumosa, geralmente, unilateral. Na mulher, a ulceração é muitas vezes acompanhada por edema importante dos grandes lábios. ▶

lesões elementares: Escoriações

causas: Infecção



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Acidente primário

continuação

As características da ulceração feminina são idênticas à do homem.

lesões elementares: Escoriações

causas: Infecção



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Sífilis secundária (roséola sífilítica)

Manifestando-se cerca de seis semanas após o início da ulceração, a sífilis secundária apresenta-se sob a forma de máculas rosadas ovulares, pouco ou nada descamativas e não pruriginosas. Estas máculas formam-se essencialmente no tronco.

lesões elementares: Mácula eritematosa

causas: Infecção



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Sífilis secundária tardia

Pápulas eritematosas escuras, por vezes acastanhadas, nitidamente endurecidas, situadas no tronco bem como nas zonas próximas dos membros.

lesões elementares: Pápulas dérmicas

causas: Infecção



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Sifilides papulosas

Máculas discretamente eritematosas com rebordo descamativo periférico ("collerette de Biett). Estas sifilides papulosas manifestam-se entre quatro a doze meses após a ulceração.

lesões elementares: Mácula eritematosa;
Pápulas dérmicas; Escamas

causas: Infecção



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Gonococcia genital

Eritema difuso da glânde peniana, gotejar purulento ao nível do meato, disúria significativa, polaquiúria. Verifica-se a presença simultânea de dois moluscos contagiosos igualmente transmitidos por via sexual.

lesões elementares: Mácula eritematosa;
Pápulas epidérmicas

causas: Infecção



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte