

Capítulo 9:

Parasitoses – Artrópodes



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior siguiente

lesiones básicas

causas

fotografía

alfabético

9.1 Sarna humana ou escabiose



Doença parasitária devida ao *Sarcoptes scabiei*. Sulcos enegrecidos, de 5 a 15 mm de comprimento, cuja extremidade apresenta intumescência ("eminência acariana"). As faces laterais dos dedos, bem como as superfícies anteriores do punho são as zonas predilectas. Numerosas escoriações por vezes acompanhando finas vesículas mais ou menos translúcidas, disseminadas no tegumento. ▶

lesões elementares: Sem especificação

causas: Infecção



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Sarna humana ou escabiose

continuação

Estas escoriações são essencialmente o sinal de prurido vespertino e nocturno muito importante. ▶

lesões elementares: Escoriações

causas: Infecção



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior seguinte



Sarna humana ou escabiose

continuação

Nódulos escabióticos: lesões nodulares eritematosas, nitidamente infiltradas, extremamente pruriginosas, nas axilas, no escroto e no pênis, subsistindo mesmo após tratamento bem conduzido. ▶

lesões elementares: Nódulos

causas: Infecção



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Sarna humana ou escabiose

continuação

Na criança, as lesões atingem com maior frequência os pés: numerosas pápulas escoriadas extremamente pruriginosas.

lesões elementares: Pápulas epidérmicas; Pústulas

causas: Infecção



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior seguinte

9.2 Sarna animal



Numerosas pequenas pápulas pruriginosas, disseminadas no conjunto do tegumento. A sua evolução é espontaneamente regressiva. Não existe sulco. A afecção originada pelo animal de companhia é a causa clássica (gato ou cão).

lesões elementares: Pápulas dérmicas

causas: Infecção



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior seguinte

9.3 Pediculose



Vasta placa impetiginizada da região da nuca, consequência de coceira devida a pediculose não diagnosticada. ▶

lesões elementares: Crostas

causas: Infecção



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Pediculose

continuação

Lêndeas presas a um cabelo.

lesões elementares: Sem especificação

causas: Infecção



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior seguinte

9.4 Piolhos



Escoriações e presença de lêndeas firmemente presas aos pêlos púbicos. Existem igualmente piolhos (*phthirus pubis*) que se agarram aos pêlos púbicos. ▶

lesões elementares: Sem especificação

causas: Infecção



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior seguinte



Piolhos

continuação

No corpo, verifica-se por vezes a existência de máculas azul-acinzentadas relativamente discretas (maculae cerulae). Estas máculas cor de ardósia correspondem à libertação de toxinas pelo piolho aquando das picadas sucessivas.

lesões elementares: Máculas cor de ardósia

causas: Infecção



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior seguinte

9.5 Picadas de insectos



Trombiculíase

Reacções imunológicas a picadas de ácaros (larvas hematófagas de trombiculidae). Pequenas lesões pruriginosas por vezes alinhadas, situadas num local indiscriminado do tegumento, com predilecção pelas zonas de fricção. Verifica-se por vezes elevação central. ▶

lesões elementares: Pápulas dérmicas

causas: Infecção



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior seguinte



Trombiculíase

continuação

lesões elementares: Pápulas dérmicas

causas: Infecção



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior seguinte



Estrófulo

Ocorrendo essencialmente na criança, o prurigo strophulus manifesta-se sob a forma de numerosas pequenas pápulas eritematosas, por vezes centradas por vesículas.

Essencialmente presentes nas pernas, estas lesões são extremamente pruriginosas, sendo facilmente escoriadas. Por vezes, verifica-se uma disposição linear, o que torna o diagnóstico mais evidente. Geralmente, o estrófulo é provocado por um ectoparasita, hospedado no gato ou no cão.

lesões elementares: Pápulas dérmicas; Vesículas

causas: Infecção



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Picadas de pulgas

Importantes pápulas inflamatórias, com disposição linear. Existe nítida elevação central. A contaminação processa-se classicamente por um animal de companhia (gato ou cão) portador de pulgas. ▶

lesões elementares: Pápulas dérmicas

causas: Infecção



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior seguinte



Picadas de pulgas

continuação

Nalguns casos, as lesões tornam-se francamente bolhosas, mesmo hemorrágicas.

lesões elementares: Bolhas

causas: Infecção



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior seguinte

9.6 Leishmaníase



Lesão volumosa papulocrostosa, rodeada por "edema inflamatório". Não existe dor nem adenopatia associada. A evolução é crónica e esta lesão resiste aos tratamentos anti-sépticos clássicos. ▶

lesões elementares: Pápulas dérmicas; Vesículas

causas: Infecção



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Leishmaníase

continuação

Após alguns meses, a lesão involui e deixa subsistir cicatriz mais ou menos visível.

Um protozoário do género leishmania é o responsável. ▶

lesões elementares: Pápulas dérmicas; Vesículas

causas: Infecção



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior seguinte



Leishmaníase

continuação

O flebótomo é o agente vector, o que explica que, na maioria dos casos, as lesões de leishmaníase se manifestem nas áreas descobertas (em particular, na face).

lesões elementares: Cicatriz

causas: Infecção



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte

9.7 Larva migrans



Trajecto serpiginoso inflamatório, com pequena pápula na extremidade, muito pruriginosa. A larva migrans é provocada por uma larva de ancilostoma que vai migrar cerca de 1 centímetro por dia, provocando assim um alongamento do trajecto inflamatório. O homem contamina-se, na maioria das vezes, na praia (solo poluído por dejectos animais).

As larvas migrans cutâneas encontram-se essencialmente nos pés e nas nádegas. ▶

lesões elementares: Pápulas dérmicas

causas: Infecção



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Larva migrans

continuação

lesões elementares: Pápulas dérmicas

causas: Infecção



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior seguinte

9.8 Tungíase ou “matacanha”



Nódulo pruriginoso, inflamatório, com uma pequena abertura enegrecida, no centro, localizado na região peri-ungueal de um dedo do pé. Pode ocorrer uma sobreinfecção secundária (formação de abscesso). A tungíase é provocada por uma pulga hematófaga: a *Tunga penetrans*. A contaminação verifica-se classicamente nos pés (caminhar descalço nas zonas de endemia, sobretudo em África e na América Central).

lesões elementares: Nódulos

causas: Infecção



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte



Tungíase ou "matacanha"

lesões elementares: Nódulos

causas: Infecção



procura



índice



imprimir



última página vista



anterior



seguinte