

## Capítulo 4:

# Urticarias



búsqueda



contenido



imprimir



última pantalla



atrás



siguiente

lesiones básicas

causas

fotografía

alfabético

## 4.1 Urticaria de contacto



### Urticaria de contacto al latex

Se manifiesta por pápulas urticariales que aparecen en los minutos siguientes de la colocación de guantes quirúrgicos de látex. Estas pápulas pueden desbordar el lugar estricto del contacto, ya que se trata de una urticaria inmunoalérgica (en ocasiones con presencia de IgE específicas). Por consiguiente, puede aparecer una urticaria generalizada con manifestaciones generales como rinitis alérgica, conjuntivitis, crisis asmáticas, shock anafiláctico.

lésiones básicas: Pápulas dérmicas

causas: Agentes químicos



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



## Prueba de puntura con latex

Diagnóstico de una urticaria de contacto al látex: la prueba de puntura se realiza mediante una lanceta y utilizando líquido de incubación de los guantes de látex sospechosos.

lésiones básicas: Pápulas dérmicas

causas: Agentes químicos



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



## Prueba de provocación con guantes de latex

En casos dudosos (difícil interpretación de la prueba de puntura) puede realizarse eventualmente una prueba de provocación mediante el guante sospechoso. Al principio se efectuará siempre la prueba colocando un dedil durante 10 minutos en manos previamente humedecidas. La prueba de provocación debe realizarse siempre en medio hospitalario.

lésiones básicas: Mácula eritematosa;  
Pápulas dérmicas

causas: Agentes químicos



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente

## 4.2 Urticarias físicas



### Dermografismo

El frotamiento de la piel con el extremo romo de un instrumento, permite detectar un eritema lineal de componente edematoso.

El dermografismo aparece de 5 a 10 minutos después del frotamiento; puede estar aislado o asociado a urticaria crónica idiopática.

lésiones básicas: Mácula eritematosa;  
Pápulas dérmicas

causas: Factores mecánicos



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente





## Urticaria por presión

Edema profundo, muy pruriginoso, que aparece varias horas (6 a 12) después de una presión intensa sobre una zona determinada por ejemplo sobre la palma de la mano. Pueden también afectarse los pies después de caminar o las nalgas cuando se ha permanecido sentado durante tiempo prolongado.

lésiones básicas: Pápulas dérmicas

causas: Factores mecánicos



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



## Criourticaria

Es una erupción desencadenada por el frío; la aplicación de un cubito de hielo durante 3 a 10 minutos reproduce sistemáticamente una pápula urticarial. Sin embargo, en el caso presente convendría eliminar en un segundo tiempo la urticaria acuagénica (por medio de una prueba de inmersión de una mano en agua a temperatura ambiente).

lésiones básicas: Mácula eritematosa;  
Pápulas dérmicas

causas: Frío



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



## Urticaria solar

Esta variedad, muy rara, de urticaria aparece en los minutos siguientes a una exposición a la luz solar. La erupción puede persistir durante 3 a 4 horas y la exploración fotobiológica confirma muy fácilmente el diagnóstico (prueba lumínica con UVA y/o UVB positiva).

lésiones básicas: Pápulas dérmicas

causas: Radiación, ultravioleta, sol (rays)



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



## 4.3 Urticarias corrientes (Medicamentosas, alimentarias, idiopáticas)



### Pápulas urticadas

Erupción de pápulas edematosas, urticadas, que pueden confluir formando grandes placas. El prurito es constante y puede impedir el sueño. Esta urticaria puede ser la primera manifestación de un shock anafiláctico.

lésiones básicas: Pápulas dérmicas

causas: Agentes químicos



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



## Urticaria papulosa

Pápulas urticariales diseminadas simétricamente sobre el cuerpo. Los medicamentos son los agentes responsables más frecuentemente incriminados. Sin embargo, los alimentos pueden causar también en ocasiones este tipo de urticaria (urticaria aguda); los más corrientes son fresas, crustáceos, pescados, ciertos cereales, leche, huevos y determinados aditivos alimentarios. El diagnóstico se basa esencialmente en pruebas de provocación (supresión y reintroducción de medicamento o del alimento implicado).

lésiones básicas: Mácula eritematosa;  
Pápulas dérmicas

causas: Agentes químicos



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



## Urticaria figurada

Las pápulas urticariales dibujan arabescos o formas geográficas. En este caso, el origen farmacológico (aspirina, codeína, penicilina, etc.) podría ser el más frecuentemente reconocido. También en este caso, la prueba de supresión seguida eventualmente de reintroducción permite obtener un diagnóstico de precisión.

lésiones básicas: Mácula eritematosa;  
Pápulas dérmicas

causas: Agentes químicos



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



## Edema de quincke

Es una urticaria profunda, poca pruriginosa, que afecta sobre todo a la cara (particularmente a los párpados y a los labios) así como a la glotis incluyendo la laringe. Se trata de un cuadro de urgencia que requiere medidas terapéuticas rápidas (sobre todo, adrenalina y corticosteroides). Las causas medicamentosas no son excepcionales.

lésiones básicas: Pápulas dérmicas

causas: Ninguna específica



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



## Vasculitis urticarial

Asociación de urticaria y de lesiones de vasculitis leucocítica clásica. Las lesiones urticariales son mucho más estables que la urticaria clásica. Persisten durante dos a tres días y se acompañan frecuentemente de artralgias y de fiebre. También se observa a menudo una hipocomplementemia.

lésiones básicas: Mácula eritematosa;  
Pápulas dérmicas

causas: Ninguna específica



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente