

Kapitel 10:

Psoriasis - Schuppenflechte



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite



zurück



vorwärts

Effloreszenzen

Ursachen

Bild

Alphabetisch

10.1 Klinische Aspekte



Psoriasis vulgaris

Erythematöse Form

Die klassische Hautveränderung der Psoriasis stellt eine scharf begrenzte, entzündliche Papel mit nicht fest haftender, parakeratotischer Schuppung dar. Die einzelnen Elemente können durch Zusammenfließen mehrerer Herde großflächig in bizarren Formen auftreten. ▶

Effloreszenzen: Erythematöse Makel; Squama

Ursachen: Nicht spezifisch



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite



zurück



vorwärts



Psoriasis vulgaris

Fortsetzung

Schuppig-erythematöse Form

Auf beiden Knien sieht man typische psoriatische Veränderungen, scharf begrenzt und bedeckt mit dicken Schuppen mit Glimmerschein. ▶

Effloreszenzen: Erythematöse Makel; Squama

Ursachen: Nicht spezifisch



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite



zurück



vorwärts



Psoriasis vulgaris

Fortsetzung

Gipsverband-artige Psoriasis

Dicke, scharf begrenzte, weißliche Schuppen. An den Rändern erkennt man stellenweise das darunterliegende Erythem. ▶

Effloreszenzen: Erythematöse Makel; Squama

Ursachen: Nicht spezifisch



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite



zurück



vorwärts



Psoriasis vulgaris

Fortsetzung

Klassische Symptome

Flecken ähneln Kerzenwachs. ▶

Effloreszenzen: Erythematöse Makel; Squama

Ursachen: Nicht spezifisch



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite



zurück



vorwärts



Psoriasis vulgaris

Fortsetzung

Klassische Symptome

Curettage der Läsionen löst eine Blutung aus. ▶

Effloreszenzen: Erythematöse Makel; Squama

Ursachen: Nicht spezifisch



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite



zurück



vorwärts



Psoriasis vulgaris

Fortsetzung

Psoriasis guttata

Auf der gesamten Haut dieses Patienten erkennt man zahllose, kleine, schuppige, erythematöse Flecken mit einem Durchmesser von wenigen Millimetern. ▶

Effloreszenzen: Erythematöse Makel; Squama

Ursachen: Nicht spezifisch



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite



zurück



vorwärts



Psoriasis vulgaris

Fortsetzung

Psoriasis guttata

In vielen Fällen stellt dies eine eruptive Form der Psoriasis in der Kindheit oder Jugend dar. ▶

Effloreszenzen: Erythematöse Makel; Squama

Ursachen: Nicht spezifisch



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite



zurück



vorwärts



Psoriasis vulgaris

Fortsetzung

Köbner-Phänomen

Isomorphe Reaktion - Psoriatische Läsion im Bereich einer chirurgischen Narbe. Bei der Mehrzahl der Patienten ist durch mechanische Irritation eine Psoriasis isomorph auslösbar.

Effloreszenzen: Erythematöse Makel; Squama

Ursachen: Mechanische Faktoren



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite



zurück



vorwärts



Psoriasis pustulosa

Pustuläre Psoriasis auf der Beugeseite des Unterarmes. Im Verlauf von akuten Schüben der Psoriasis kann es zu pustulösen Eruptionen kommen, wobei multiple, gruppiert stehende und oft zusammenlaufende, weiße, auf Berührung schmerzhaft, intraepidermale Pusteln auf geröteter Haut stehen. Die Pusteln entstehen durch leukozytäre Anschoppung von gekammerten Bläschen der Epidermis und sind steril. ▶

Effloreszenzen: Erythematöse Makel; Pustel

Ursachen: Nicht spezifisch



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite



zurück



vorwärts



Psoriasis pustulosa

Fortsetzung

Akral lokalisierter Typ Barber. Auf geröteter Haut stehen sterile, spongiforme Pusteln voller Leukozyten. ▶

Effloreszenzen: Erythematöse Makel; Pustel;
Squama

Ursachen: Nicht spezifisch



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite



zurück



vorwärts



Psoriasis pustulosa

Fortsetzung

Junge Pusteln erscheinen gelbweißlich und erhaben, ältere Pusteln bräunlich und eingebettet in die Hornhaut.

Effloreszenzen: Erythematöse Makel; Pustel; Squama

Ursachen: Nicht spezifisch



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite



zurück



vorwärts



Psoriatische Erythrodermie

In den beiden Bildern breitet sich diese Form der Psoriasis auf das gesamte Integumentum aus. ▶

Effloreszenzen: Erythematöse Makel; Squama

Ursachen: Nicht spezifisch



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite



zurück



vorwärts



Psoriatische Erythrodermie

Fortsetzung

Effloreszenzen: Erythematöse Makel; Squama

Ursachen: Nicht spezifisch



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite



zurück



vorwärts

10.2 Lokalisierte Sonderformen der Schuppenflechte



Psoriasis plantaris et palmaris

Im Bild eine palmare Psoriasis mit schuppigem Erythem und betont runden Konturen. Typisch sind auch die dicken, perlmuttartigen Schuppen, welche die psoriatischen Läsionen bedecken.

Effloreszenzen: Erythematöse Makel; Squama

Ursachen: Nicht spezifisch



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite



zurück vorwärts



Inverse Psoriasis der Axilla

Die psoriatische Eruption besteht aus einem hellroten, weichen, schimmernden Plaque mit geringer Schuppenbildung und scharfer Begrenzung.

Effloreszenzen: Erythematöse Makel; Squama

Ursachen: Nicht spezifisch



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite



zurück



vorwärts



Psoriasis der Nägel

Tüpfelnägel als symptomlose, kleine trichterförmige Einziehungen der Nagelplatte. Umschriebene Onycholysen an mehreren Nägeln mit gelbbräunlichen, scharf begrenzten Ablösungen der Nagelplatte von der Unterlage. In der Nagelmitte imponieren sie als Ölfleck, der im Nagelbett liegt. Nageldystrophien mit Verdickung und Verwerfung des gesamten Nagels, oft schmerzhaft (Krümelnägel). Klassische psoriatische Läsionen greifen auf das Nagelbett über.

Effloreszenzen: Erythematöse Makel; Squama

Ursachen: Nicht spezifisch



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite



zurück



vorwärts



Psoriasis der Kopfhaut

Die rundlichen, schuppigen, erythematösen Läsionen dehnen sich über den Haaransatz hinweg aus und greifen auf die Halsregion über.

Effloreszenzen: Erythematöse Makel; Squama

Ursachen: Nicht spezifisch



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite



zurück



vorwärts



Seborrhoische Psoriasis des Gesichtes

Psoriatische Läsionen im Gesicht sind selten und betreffen vorwiegend die seborrhoischen Regionen, wie Nasenflügel, den Bereich zwischen den Augenbrauen und Haaransatz.

Effloreszenzen: Erythematöse Makel; Squama

Ursachen: Nicht spezifisch



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite



zurück



vorwärts



Psoriasis der Schleimhäute

Psoriasis der Zunge

Erythematöse und leicht glänzende Plaques mit deutlicher Abgrenzung vom gesunden Gewebe auf der Oberfläche der Zunge. Das Bild gleicht der Landkartenzunge, der benignen migratorischen Glossitis oder Lingua erythema migrans. ▶

Effloreszenzen: Erythematöse Makel

Ursachen: Nicht spezifisch



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite



zurück



vorwärts



Psoriasis der Schleimhäute

Fortsetzung

Psoriasis auf der Glans penis

Relativ großflächige, gut umschriebene Plaques ohne Infiltration und ohne Schuppenbildung. Chronischer Verlauf. Oft ergeben sich bei diesem Bild Probleme mit der Differentialdiagnose gegenüber anderen Arten der Balanitis.

Effloreszenzen: Erythematöse Makel

Ursachen: Nicht spezifisch



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite



zurück



vorwärts