

## Capitolo 4:

# Orticarie



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo

lesioni basali

cause

foto

alfabetico

## 4.1 Orticarie da contatto



### Orticaria da contatto con gomma

"I segni di frustata" da orticaria si manifestano pochi minuti dopo aver messo dei guanti da chirurgo in gomma. Questi "segni di frustata" possono disseminare al di là della zona di contatto effettivo poiché si tratta di un'orticaria immunoallergica (a volte sono presenti delle IgE specifiche). Può quindi svilupparsi un'orticaria generalizzata con sintomi sistemici: rinite allergica, congiuntivite, accessi simili all'asma, shock anafilattico ecc.

lesioni basali: Papule dermiche

cause: Agenti chimici



ricerca



contenuti



stampa




ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Test di punzione con gomma

Diagnosi dell'orticaria da contatto con gomma : il test di punzione viene eseguito con un bisturi, usando del liquido d'incubazione proveniente da guanti di gomma sospetti.

lesioni basali: Papule dermiche

cause: Agenti chimici



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Test d'irritazione con guanti di gomma

In caso di dubbio (test di punzione difficile da interpretare), si può eseguire un test d'irritazione, se necessario usando il guanto sospetto. Dapprima il test viene sempre effettuato con un copridito che si infila su un dito umido durante 10 minuti. Il test d'irritazione deve sempre essere eseguito in ambiente ospedaliero.

lesioni basali: Macula eritematosa;  
Papule dermiche

cause: Agenti chimici



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo

## 4.2 Orticarie da causa fisica



### Dermografismo

Strofinando la cute con una punta smussa si provoca un eritema lineare con componente edematosa. Il dermografismo appare 5 a 10 minuti dopo lo sfregamento. Può essere un fenomeno isolato od associato ad un'orticaria cronica idiopatica.

lesioni basali: Macula eritematosa;  
Papule dermiche

cause: Fattori meccanici



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Orticaria ritardata alla pressione

Edemi profondi e molto pruriginosi che si manifestano molto tempo (6 a 12 ore) dopo l'applicazione di una forte pressione su un'area ben precisa p.es. sul palmo della mano. Può apparire anche sui piedi dopo la deambulazione come pure sui glutei dopo prolungata permanenza in posizione seduta.

lesioni basali: Papule dermiche

cause: Fattori meccanici



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Orticaria da freddo

L'eruzione è provocata dal freddo : l'applicazione di un cubetto di ghiaccio durante 3 - 10 minuti produce un "segno di frustata" da orticaria. Tuttavia, nel caso presente sarebbe più appropriato effettuare un secondo test per eliminare la possibilità che si tratti di un'orticaria acquagenica (mediante immersione di una mano in acqua a temperatura ambiente).

lesioni basali: Macula eritematosa;  
Papule dermiche

cause: Freddo



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Orticaria solare

Questa rarissima variante di orticaria si manifesta alcuni minuti dopo l'esposizione alla luce solare. L'eruzione può persistere per tre o quattro ore.

Un esame fotobiologico può facilmente confermare la diagnosi (test di fotosensibilizzazione ai raggi ultravioletti (UVA e/o UVB) positivo).

lesioni basali: Papule dermiche

cause: Raggi solari, raggi ultravioletti



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo

## 4.3 Orticarie comuni (reazione a farmaci, ad alimenti ed idiopatiche)



### "Segni di frustata" da orticaria

Eruzioni di "segni di frustata" edematosi, che possono confluire in grandi chiazze. Il prurito è costante e può impedire il sonno. Questa orticaria può essere il primo segnale di uno shock anafilattico.

lesioni basali: Papule dermiche

cause: Agenti chimici



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Orticaria papulosa

"Segni di frustata" disseminati simmetricamente sul corpo, nella maggior parte dei casi provocati da farmaci. Certi alimenti possono a volte provocare questo tipo d'orticaria (orticaria acuta). Le fragole, i crostacei, il pesce, alcuni cereali, il latte, le uova ed alcuni additivi alimentari ne sono la causa più frequente. La diagnosi è basata essenzialmente sui test d'irritazione (soppressione e reintroduzione del farmaco od alimento sospetto).

lesioni basali: Macula eritematosa;  
Papule dermiche

cause: Agenti chimici



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Orticaria figurata

Le papule orticariali presentano arabeschi o forme geografiche. In questo caso, la causa è molto sovente un farmaco (aspirina, codeina, penicillina.).

Anche qui un test di soppressione e di reintroduzione, se adeguato, permette di stabilire una diagnosi esatta.

lesioni basali: Macula eritematosa;  
Papule dermiche

cause: Agenti chimici



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Angioedema ereditario

Orticaria profonda, non molto pruriginosa che colpisce principalmente il viso (specialmente le palpebre e le labbra), la glottide e perfino la laringe. Si tratta di un caso d'emergenza che necessita un rapido intervento terapeutico (specialmente adrenalina e corticosteroidi). Non sono rare le cause iatrogeniche.

lesioni basali: Papule dermiche

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo



## Orticaria-vasculite

Una combinazione di orticaria e di lesioni di vasculite leucocitoclasica. Le lesioni dovute all'orticaria durano più a lungo che nell'orticaria classica (da 2 a 3 giorni) e sono frequentemente accompagnate da artralgie e febbre.

Si constata una diminuzione della quantità di complemento nel sangue.

lesioni basali: Macula eritematosa;  
Papule dermiche

cause: Nessuna specificità



ricerca



contenuti



stampa



ultimo schermo visto



indietro



prossimo