

Capítulo 7:

Treponematosi y otras enfermedades de transmisión sexual



búsqueda



contenido



imprimir



última pantalla



atrás



siguiente

7.1 Sífilis



Chancro sifilítico

Es una exulceración con erosión localizada sobre el glande o la superficie cutánea del pene. A la palpación, induración definida. Adenopatía inguinal voluminosa que suele ser unilateral. En la mujer el chancro se acompaña a menudo de un edema intenso de los grandes labios. ▶

lésiones básicas: Excoriaciones

causas: Infección



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Chancro sifilítico

continuar

Las características del chancro femenino son idénticas a las del masculino.

lésiones básicas: Excoriaciones

causas: Infección



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Sífilis secundaria (roseola sifilítica)

Aparece alrededor de 6 semanas después del inicio del chancro y se presenta en forma de máculas rosadas, ovaladas, poco o nada escamosas y no pruriginosas. Estas máculas se localizan fundamentalmente sobre el tronco.

lésiones básicas: Mácula eritematosa

causas: Infección



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Sífilis secundaria tardía

Aparecen pápulas de color rojo oscuro, en ocasiones parduzcas, no pruriginosas, muy claramente induradas, que se sitúan en el tronco y en las regiones proximales de las extremidades.

lésiones básicas: Pápulas dérmicas

causas: Infección



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Sifíldes papulosas

Son máculas discretamente rojizas con collarín descamativo periférico (collarín de Biett). Estas sifíldes papulosas aparecen al cabo de 4 a 12 meses del inicio del chancro.

lésiones básicas: Mácula eritematosa;
Pápulas dérmicas; Escamas

causas: Infección



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente



Gonococia genital

Enrojecimiento difuso del glande, gotita purulenta a nivel del meato, disuria intensa, polaquiuria. Adviértase a presencia simultánea de dos moluscos contagiosos transmitidos también por viera sexual.

lésiones básicas: Mácula eritematosa;
Pápulas epidérmicas

causas: Infección



búsqueda contenido imprimir



última pantalla



atrás



siguiente